


AMSLER-GITTER ZUR FRÜHERKENNUNG VON AUGENERKRANKUNGEN WIE AMD (ALTERSBEDINGTE MAKULA-DEGENERATION)

Der Amsler-Gitter-Test ist die einfachste Methode zur AMD-Früherkennung und kann auch zu Hause durchgeführt werden. Bei Verdacht auf eine Erkrankung kann er jedoch die Untersuchung beim Augenarzt nicht ersetzen!



ANLEITUNG

Schauen Sie in gewohnter Entfernung auf den Monitor, ggf. mit Ihrer gewohnten (Lese-) Brille. Verschießen Sie ein Auge.

Fixieren Sie den Punkt in der Mitte des Gitters und achten Sie darauf, ob:

- alle Linien des Gitters gerade sind
- die Quadrate gleich groß und alle 4 Ecken sichtbar sind
- Sie leere, verzerrte oder verschwommene Stellen sehen.

Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge.

BEI UNREGELMÄSSIGKEITEN SOLLTEN SIE SICH UNVERZÜGLICH BEI UNS MELDEN.

Mit dem Amsler-Gitter sind Metamorphopsien nur schwer zu quantifizieren. Diese können ein Hinweis auf eine Netzhauterkrankung sein, bedeuten aber nicht zwangsläufig das Vorliegen einer altersbedingten Makuladegeneration.

